

GOLYTELY 2 DAY SPANISH

Phone: (909)833 7556

- **CONFIRME SU UBICACIÓN:**

- POMONA VALLEY HOSPITAL**

1798 N. Garey Ave, Pomona, CA 91767

Teléfono: (909) 865-9141

- ARCHIBALD SURGERY CENTER** 9674 Archibald Ave, Suite 175, Rancho Cucamonga, CA 91730

(Llamaremos 1-2 días hábiles antes para dar el horario exacto del procedimiento)

Teléfono: (909) 296-8930

- **POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR:**

- **ORGANICE EL TRANSPORTE:** Dado que la endoscopia implica anestesia o sedación, debe contar con alguien que lo lleve a su casa y se quede con usted durante 2 a 4 horas después del procedimiento. Puede utilizar los servicios de Uber o Lyft, pero debe contar con un adulto responsable que no sea el conductor para el alta.

- **Informe al consultorio de inmediato**
- **Si comenzó a tomar medicamentos inmunosupresores NUEVOS o un régimen de quimioterapia.**
- **Siente dolor en el pecho, dificultad para respirar o mareos.**
- **Si hay un cambio en su cobertura de seguro.**

- **SUSPENDA LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS:**

14 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO	Ozempic/ Wegovy: Semaglutide Mounjaro: Trizepatide Trulicity: Dulaglutide Saxenda/Victoza: Liraglutide
5 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO	NSAIDs: Advil, Ibuprofen, Motrin, Aspirin, Aleve, Naproxen, Celebrex, Diclofenac, Meloxicam Coumadin/ Warfarin Terapia antiplaquetaria: Plavix/ Clopidogrel, Prasugrel/ Effient, Ticlopidine/ Ticlid, Brilinta/Ticagrelor, Aspirin, Excedrin. Suplementos: Cualquier suplemento de hierro o multivitamínico (con hierro), aceite de pescado, vitamina E, omega-3, CoQ10, Fosamax y ajo.
3 DÍAS ANTES DEL	Apixaban/ Eliquis

GOLYTELY 2 DAY SPANISH

Phone: (909)833 7556

PROCEDIMIENTO	Rivaroxaban/ Xarelto Dabigatran/ Pradaxa Edoxaban/ Savaysa
----------------------	--

- Esta preparación está destinada a limpiar el colon y puede provocar calambres leves, diarrea y molestias rectales y abdominales. Se esperan pequeñas cantidades de sangrado rectal, dolores de cabeza, fatiga y náuseas.
- **POR FAVOR QUÉDATE EN CASA Y PLANEA PERMANECER CERCA DEL BAÑO; ESTE MEDICAMENTO PUEDE FUNCIONAR RÁPIDAMENTE.** Si alguno de estos síntomas es significativo o tiene preguntas, no dude en contactarnos.
- Usar vaselina o ungüento para la dermatitis del pañal entre las deposiciones ayudará a prevenir la irritación rectal. También puedes utilizar toallitas húmedas para bebés en lugar de papel higiénico.

2 DÍAS ANTES DE LA CITA: Puede comer normal.

PASO 1: Tome 2 tabletas de Dulcolax en la mañana.

PASO 2: Tome 2 tabletas de Dulcolax en la noche.

EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO. Beba líquidos claros todo el día. Asegúrese de beber muchos líquidos antes del procedimiento. Si usted se deshidrata, podría afectar la función **renal**. No tome/coma productos lácteos o alimentos sólidos. **Nada de color ROJO. MORADO. No se permiten bebidas alcohólicas.**

Para sus medicamentos **de diabetes o insulina, tome un poco menos de lo normal el día antes del procedimiento.**

PASO 1: A las 6:00 pm, tome 2 tabletas de Dulcolax Laxatives.

PASO 2: A las 6:30 pm, empiece a beber un vaso de 8 onzas de Golytely cada 15 minutos hasta que se haya consumido la mitad del galón.

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO: ¡MANTÉNGASE HIDRATADO!

5 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

PASO 3: Debe beber lo restante del Golytely. Debe completar toda la solución Golytely aunque las heces sean **claras**. Su materia fecal debe ser de color **amarillo claro**.

PASO 4: Tome las ultimas **2** tabletas de Dulcolax.

3 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO: NO BEBA AGUA NI NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

USTED PUEDE TOMAR MEDICAMENTOS IMPORTANTES (como medicamentos para el corazón, la presión arterial, la tiroides o las convulsiones) con un pequeño sorbo de agua la mañana del

GOLYTELY 2 DAY SPANISH

Phone: (909)833 7556

procedimiento.

NO use insulina ni sus medicamentos para la diabetes hasta después del procedimiento.