

GOLYTELY SPANISH

Phone: (909)833 7556

CONFIRME SU UBICACIÓN:

POMONA VALLEY HOSPITAL

1798 N. Garey Ave, Pomona, CA 91767

Teléfono: (909) 865-9141

ARCHIBALD SURGERY CENTER 9674 Archibald Ave, Suite 175, Rancho Cucamonga, CA 91730

(Llamaremos 1-2 días hábiles antes para dar el horario exacto del procedimiento)

Teléfono: (909) 296-8930

- POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR:**

- ORGANICE EL TRANSPORTE:** Dado que la endoscopia implica anestesia o sedación, debe contar con alguien que lo lleve a su casa y se quede con usted durante 2 a 4 horas después del procedimiento. Puede utilizar los servicios de Uber o Lyft, pero debe contar con un adulto responsable que no sea el conductor para el alta.

Informe al consultorio de inmediato

- Si comenzó a tomar medicamentos inmunosupresores NUEVOS o un régimen de quimioterapia.
- Siente dolor en el pecho, dificultad para respirar o mareos.
- Si hay un cambio en su cobertura de seguro.

SUSPENDA LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS:

14 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO	Ozempic/ Wegovy: Semaglutide Mounjaro: Trizepatide Trulicity: Dulaglutide Saxenda/Victoza: Liraglutide
5 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO	NSAIDs: Advil, Ibuprofen, Motrin, Aspirin, Aleve, Naproxen, Celebrex, Diclofenac, Meloxicam Coumadin/ Warfarin Terapia antiplaquetaria: Plavix/ Clopidogrel, Prasugrel/ Effient, Ticlopidine/ Ticlid, Brilinta/Ticagrelor, Aspirin, Excedrin. Suplementos: Cualquier suplemento de hierro o multivitamínico (con hierro), aceite de pescado, vitamina E, omega-3, CoQ10, Fosamax y ajo.
3 DÍAS ANTES DEL	Apixaban/ Eliquis

GOLYTELY SPANISH

Phone: (909)833 7556

PROCEDIMIENTO	Rivaroxaban/ Xarelto Dabigatran/ Pradaxa Edoxaban/ Savaysa
---------------	--

- Esta preparación está destinada a limpiar el colon y puede provocar calambres leves, diarrea y molestias rectales y abdominales. Se esperan pequeñas cantidades de sangrado rectal, dolores de cabeza, fatiga y náuseas.
- POR FAVOR QUÉDATE EN CASA Y PLANEE PERMANECER CERCA DEL BAÑO; ESTE MEDICAMENTO PUEDE FUNCIONAR RÁPIDAMENTE. Si alguno de estos síntomas es significativo o tiene preguntas, no dude en contactarnos.
- Usar vaselina o ungüento para la dermatitis del pañal entre las deposiciones ayudará a prevenir la irritación rectal. También puedes utilizar toallitas húmedas para bebés en lugar de papel higiénico.

EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO. Beba líquidos claros **todo el día.** Asegúrese de beber muchos líquidos antes del procedimiento. Si usted se deshidrata, podría afectar la función **renal.** No tome/coma productos lácteos o alimentos sólidos. **Nada de color ROJO. MORADO. No se permiten bebidas alcohólicas.**

Para sus medicamentos **de diabetes o insulina, tome un poco menos de lo normal el día antes del procedimiento.**

PASO 1: A las 6:00 pm, tome 2 tabletas de Dulcolax Laxatives.

PASO 2: A las 6:30 pm, empiece a beber un vaso de 8 onzas de Golytely cada 15 minutos hasta que se haya consumido la mitad del galón.

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO: ¡MANTÉNGASE HIDRATADO!

5 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

PASO 3: Debe beber lo restante del Golytely. Debe completar toda la solución Golytely aunque las heces sean **claras.** Su materia fecal debe ser de color **amarillo claro.**

PASO 4: Tome las ultimas **2** tabletas de Dulcolax.

3 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO: NO BEBA AGUA NI NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

USTED PUEDE TOMAR MEDICAMENTOS IMPORTANTES (como medicamentos para el corazón, la presión arterial, la tiroides o las convulsiones) con un pequeño sorbo de agua la mañana del procedimiento.

NO use insulina ni sus medicamentos para la diabetes hasta después del procedimiento.