

PLENVU- SPANISH

Phone: (909)833 7556

CONFIRME SU UBICACIÓN:

POMONA VALLEY HOSPITAL

1798 N. Garey Ave, Pomona, CA 91767

Teléfono: (909) 865-9141

ARCHIBALD SURGERY CENTER 9674 Archibald Ave, Suite 175, Rancho Cucamonga, CA 91730

(Llamaremos 1-2 días hábiles antes para dar el horario exacto del procedimiento)

Teléfono: (909) 296-8930

- POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR:**
 - ORGANICE EL TRANSPORTE:** Dado que la endoscopia implica anestesia o sedación, debe contar con alguien que lo lleve a su casa y se quede con usted durante 2 a 4 horas después del procedimiento. Puede utilizar los servicios de Uber o Lyft, pero debe contar con un adulto responsable que no sea el conductor para el alta.
 - Informe al consultorio de inmediato**
 - Si comenzó a tomar medicamentos inmunosupresores NUEVOS o un régimen de quimioterapia.**
 - Siente dolor en el pecho, dificultad para respirar o mareos.**
 - Si hay un cambio en su cobertura de seguro.**
- SUSPENDA LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS:**

14 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO	Ozempic/ Wegovy: Semaglutide Mounjaro: Trizepatide Trulicity: Dulaglutide Saxenda/Victoza: Liraglutide
5 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO	NSAIDs: Advil, Ibuprofen, Motrin, Aspirin, Aleve, Naproxen, Celebrex, Diclofenac, Meloxicam Coumadin/ Warfarin Terapia antiplaquetaria: Plavix/ Clopidogrel, Prasugrel/ Effient, Ticlopidine/ Ticlid, Brilinta/Ticagrelor, Aspirin, Excedrin. Suplementos: Cualquier suplemento de hierro o multivitamínico (con hierro), aceite de pescado, vitamina E, omega-3, CoQ10, Fosamax y ajo.
3 DÍAS ANTES DEL	Apixaban/ Eliquis

PLENVU- SPANISH

Phone: (909)833 7556

PROCEDIMIENTO	Rivaroxaban/ Xarelto Dabigatran/ Pradaxa Edoxaban/ Savaysa
----------------------	--

- Esta preparación está destinada a limpiar el colon y puede provocar calambres leves, diarrea y molestias rectales y abdominales. Se esperan pequeñas cantidades de sangrado rectal, dolores de cabeza, fatiga y náuseas.
- POR FAVOR QUÉDATE EN CASA Y PLANEA PERMANECER CERCA DEL BAÑO; ESTE MEDICAMENTO PUEDE FUNCIONAR RÁPIDAMENTE. Si alguno de estos síntomas es significativo o tiene preguntas, no dude en contactarnos.
- Usar vaselina o ungüento para la dermatitis del pañal entre las deposiciones ayudará a prevenir la irritación rectal. También puedes utilizar toallitas húmedas para bebés en lugar de papel higiénico.

1 DÍA ANTES DE LA CITA: NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO.

Beba líquidos claros durante todo el día. No tome/coma productos lácteos, leche, o alimentos sólidos. Nada de color ROJO, MORADO.

No se permiten bebidas alcohólicas.

Si se deshidrata, podría afectar a la función renal.

Pare sus medicamentos de diabetes o insulina, o tome un poco menos de lo normal.

LA NOCHE ANTES DE SU COLONOSCOPIA A LAS 6:00 pm (Primera dosis - Sabor Mango)

PASO 1: Vierta el paquete "Dose 1" al recipiente de mezcla.

PASO 2: Agregue agua a la línea de 16oz y mezcle hasta que se disuelva completamente.

PASO 3: Beba el líquido en el recipiente dentro de 30 minutos.

PASO 4: Usted DEBE beber 1 vaso de 16oz de agua sobre los próximos 30 minutos.

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

5 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO: (Segunda dosis - Fruit Punch)

PASO 1: Vierta los paquetes "Dose 2 (A & B)" al recipiente de mezcla.

PASO 2: Agregue agua a la línea de 16oz y mezcle hasta que se disuelva completamente.

PASO 3: Beba el líquido en el recipiente dentro de 30 minutos.

PASO 4: Usted DEBE beber 1 vaso de 16oz de agua sobre los próximos 30 minutos.

3 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO: NO BEBA AGUA NI NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

USTED PUEDE TOMAR MEDICAMENTOS IMPORTANTES (como medicamentos para el corazón, la presión arterial, la tiroides o las convulsiones) con un pequeño sorbo de agua la mañana del procedimiento.

NO use insulina ni sus medicamentos para la diabetes hasta después del procedimiento.