

# SUPREP SPANISH

Phone: (909)833 7556

## CONFIRME SU UBICACIÓN:

**POMONA VALLEY HOSPITAL**

1798 N. Garey Ave, Pomona, CA 91767

Teléfono: (909) 865-9141

**ARCHIBALD SURGERY CENTER** 9674 Archibald Ave, Suite 175, Rancho Cucamonga, CA 91730

(Llamaremos 1-2 días hábiles antes para dar el horario exacto del procedimiento)

Teléfono: (909) 296-8930

- POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR:**
  - ORGANICE EL TRANSPORTE:** Dado que la endoscopia implica anestesia o sedación, debe contar con alguien que lo lleve a su casa y se quede con usted durante 2 a 4 horas después del procedimiento. Puede utilizar los servicios de Uber o Lyft, pero debe contar con un adulto responsable que no sea el conductor para el alta.
  - Informe al consultorio de inmediato**
  - Si comenzó a tomar medicamentos inmunosupresores NUEVOS o un régimen de quimioterapia.**
  - Siente dolor en el pecho, dificultad para respirar o mareos.**
  - Si hay un cambio en su cobertura de seguro.**
- SUSPENDA LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS:**

<b>14 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO</b>	Ozempic/ Wegovy: Semaglutide Mounjaro: Trizepatide Trulicity: Dulaglutide Saxenda/Victoza: Liraglutide
<b>5 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO</b>	NSAIDs: Advil, Ibuprofen, Motrin, Aspirin, Aleve, Naproxen, Celebrex, Diclofenac, Meloxicam  Coumadin/ Warfarin  Terapia antiplaquetaria: Plavix/ Clopidogrel, Prasugrel/ Effient, Ticlopidine/ Ticlid, Brilinta/Ticagrelor, Aspirin, Excedrin.  Suplementos: Cualquier suplemento de hierro o multivitamínico (con hierro), aceite de pescado, vitamina E, omega-3, CoQ10, Fosamax y ajo.
<b>3 DÍAS ANTES DEL</b>	Apixaban/ Eliquis

# SUPREP SPANISH

Phone: (909)833 7556

<b>PROCEDIMIENTO</b>	Rivaroxaban/ Xarelto Dabigatran/ Pradaxa Edoxaban/ Savaysa
----------------------	--

- Esta preparación está destinada a limpiar el colon y puede provocar calambres leves, diarrea y molestias rectales y abdominales. Se esperan pequeñas cantidades de sangrado rectal, dolores de cabeza, fatiga y náuseas.
- POR FAVOR QUÉDATE EN CASA Y PLANEE PERMANECER CERCA DEL BAÑO; ESTE MEDICAMENTO PUEDE FUNCIONAR RÁPIDAMENTE. Si alguno de estos síntomas es significativo o tiene preguntas, no dude en contactarnos.
- Usar vaselina o ungüento para la dermatitis del pañal entre las deposiciones ayudará a prevenir la irritación rectal. También puedes utilizar toallitas húmedas para bebés en lugar de papel higiénico.

## LA NOCHE ANTES DE SU COLONOSCOPIA A LAS 6:00 pm (1.<sup>a</sup> DOSIS)

Paso 1: Vierta UNA botella de 6 oz de líquido Suprep en el recipiente de mezcla.

Paso 2: Agregue agua potable fría hasta la línea de 16 oz en el recipiente y mezcle.

Paso 3: Bebe TODO el líquido del recipiente.

Paso 4: DEBE beber dos (2) recipientes más de agua de 16 oz durante la siguiente hora.

## EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO (2DA DOSIS)

### 5 horas antes de su procedimiento:

Paso 1: Vierta UNA botella de 6 oz de líquido Suprep en el recipiente de mezcla.

Paso 2: Agregue agua potable fría hasta la línea de 16 onzas del recipiente y mezcle.

Paso 3: Bebe TODO el líquido del recipiente.

Paso 4: DEBE beber dos (2) recipientes más de agua de 16 oz durante la siguiente hora.

## 3 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO: NO BEBA AGUA NI NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

**USTED PUEDE TOMAR MEDICAMENTOS IMPORTANTES (como medicamentos para el corazón, la presión arterial, la tiroides o las convulsiones) con un pequeño sorbo de agua la mañana del procedimiento.**

**NO use insulina ni sus medicamentos para la diabetes hasta después del procedimiento.**