

INSTRUCCIONES PARA ENDOSCÓPICOS SUPERIORES

Phone: (909)833 7556

CONFIRME SU UBICACIÓN:

POMONA VALLEY HOSPITAL

1798 N. Garey Ave, Pomona, CA 91767

Teléfono: (909) 865-9141

ARCHIBALD SURGERY CENTER 9674 Archibald Ave, Suite 175, Rancho Cucamonga, CA 91730

(Llamaremos 1-2 días hábiles antes para dar el horario exacto del procedimiento)

Teléfono: (909) 296-8930

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR:

ORGANICE EL TRANSPORTE: Dado que la endoscopia implica anestesia o sedación, debe contar con alguien que lo lleve a su casa y se quede con usted durante 2 a 4 horas después del procedimiento. Puede utilizar los servicios de Uber o Lyft, pero debe contar con un adulto responsable que no sea el conductor para el alta.

Informe al consultorio de inmediato

Si comenzó a tomar medicamentos inmunosupresores NUEVOS o un régimen de quimioterapia.

Siente dolor en el pecho, dificultad para respirar o mareos.

Si hay un cambio en su cobertura de seguro.

SUSPENDA LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS:

14 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO	Ozempic/ Wegovy: Semaglutide Mounjaro: Trizepatide Trulicity: Dulaglutide Saxenda/Victoza: Liraglutide
5 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO	NSAIDs: Advil, Ibuprofen, Motrin, Aspirin, Aleve, Naproxen, Celebrex, Diclofenac, Meloxicam Coumadin/ Warfarin Terapia antiplaquetaria: Plavix/ Clopidogrel, Prasugrel/ Effient,Ticlopidine/ Ticlid, Brilinta/Ticagrelor, Aspirin, Excedrin. Suplementos: Cualquier suplemento de hierro o multivitamínico (con hierro), aceite de pescado, vitamina E, omega-3, CoQ10, Fosamax y ajo.

INSTRUCCIONES PARA ENDOSCÓPICOS SUPERIORES

Phone: (909)833 7556

3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO	Apixaban/ Eliquis Rivaroxaban/ Xarelto Dabigatran/ Pradaxa Edoxaban/ Savaysa
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

1 DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

No ingiera ningún alimento sólido después de la medianoche, la noche anterior al procedimiento.

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

No coma ni beba nada al menos 8 horas antes del procedimiento. Esto incluye no masticar chicle ni caramelos duros 4 horas antes del procedimiento.

Use ropa holgada y cómoda.

PUEDE TOMAR MEDICAMENTOS IMPORTANTES (como medicamentos para el corazón, la presión arterial, la tiroides o las convulsiones) con un pequeño sorbo de agua en la mañana del procedimiento.

NO tome insulina ni sus medicamentos para la diabetes hasta después del procedimiento.

Si es diabético, se le controlará el nivel de glucosa en sangre al llegar al laboratorio de endoscopia y se corregirá si es necesario.